



Liều gấp đôi có vấn đề gì không?

Quá nhiều chất Acetaminophen, đó là vấn đề!

SỰ KIẾN: Acetaminophen là nguyên nhân gây hư gan #1 tại Hoa Kỳ.

- Acetaminophen hiện diện trong nhiều loại thuốc không cần toa (OTC), thí dụ như Tylenol, Anacin, Excedrin, Liquiprin, Midol, Panadol, Robitussin, Sudafed, Tavist, TheraFlu, Traminic, Vick's, các loại thuốc thông thường, và các thuốc theo toa (như Tylenol có chất codein).

SỰ KIẾN: Nếu quý vị dùng hơn một loại thuốc có chất acetaminophen thì quý vị bị rủi ro.

SỰ KIẾN: Acetaminophen là loại thuốc giảm đau thông dụng nhất tại Hoa Kỳ.

- Nó rất thông dụng trong nhiều loại thuốc theo toa và không cần toa — để trị nhức đầu, hành kinh, đau nhức tổng quát, sốt, và các đau đớn khác.
- Trong bất cứ tuần lễ nào, khoảng 23 phần trăm người lớn (48.1 triệu người) cho biết họ có dùng sản phẩm chứa chất acetaminophen.

SỰ KIẾN: Trong vai trò người tiêu thụ và bệnh nhân chúng ta không đọc nhãn thuốc cẩn thận.

- 56 phần trăm không đọc xem thuốc của họ có chứa những hoạt chất nào.
- 80 phần trăm cho biết họ không đọc nhãn thuốc để tìm hiểu các tác động phụ có thể xảy ra.

SỰ KIẾN: Có thể ngừa được chứng hư gan vì dùng quá nhiều chất acetaminophen.

Giảm bớt rủi ro của quý vị!

- Đọc nhãn thuốc của quý vị. So sánh những phần ghi các hoạt chất.
- Dùng chung hai loại thuốc khác nhau—mà cả hai đều có chất acetaminophen. Nếu không chắc, hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ xem loại thuốc nào tốt nhất cho quý vị.
- Nếu quý vị nghĩ rằng mình đã dùng quá nhiều acetaminophen, hãy đi khám y khoa ngay.
- Hãy thận trọng khi cho trẻ uống thuốc. Nhiều loại thuốc giảm sốt và thuốc ho/cảm cho trẻ em có chứa chất acetaminophen.

Vài Dấu Hiệu Cho Thấy Có Thể Dùng Quá Nhiều Acetaminophen

- **Toàn bộ cơ thể:** Đổ mồ hôi, giật kinh
- **Đường ruột:** Tiêu chảy, đau bụng, biếng ăn, buồn nôn và/hoặc ói mửa
- **Hệ Thống Thần Kinh:** Khó chịu, hôn mê

GHI CHÚ: Có thể các triệu chứng không bắt đầu cho đến khi đã uống thuốc được 12 tiếng.