emergency contraception

事後避孕丸的功能與簡介

事後避孕丸在性交後是一種安全又有效的避孕方法。

如果妳有以下任何情況，妳可以考慮使用事後避孕丸:

- 在性交過程中妳並沒有採取一般避孕措施。
- 又或者是，妳認為妳使用的避孕方法並沒有生效。

什麼是事後避孕丸?

事後避孕丸與一般避孕丸功能相似，可以幫助妳避免懷孕。事後避孕丸有以下三種基本的類別：

- Plan B™ 單方黃體素事後避孕丸
- Preven™ 複合式雌激素/ 黃體素事後避孕丸
- 高劑量的一般性口服避孕丸

不要拖延！服用事後避孕丸越早越好。

- 在沒有使用避孕措施的性交後，最好在三天內儘快服用事後避孕丸。
- 事後避孕丸越早服用效果越好。
- 想要知道更多相關資料，請與妳的藥劑師或醫師洽詢。

事後避孕丸是安全、有效的。

- 單方黃體素事後避孕丸，避孕效果可達89%*。
- 服用複合式雌激素/ 黃體素事後避孕丸，避孕效果可達75%*。
- 在平常及長時期需要避孕的情況下，一般的避孕方法比事後避孕丸避孕效果更佳。
- 事後避孕丸沒有預防性病，如：愛滋病等功能。

*此為使用一次後，能降低懷孕的百分比。

事後避孕丸不會有墮胎效果。

- 事後避孕丸與RU-486 (墮胎藥) 不同。
- 如果已經懷孕，事後避孕丸將不會產生墮胎效果或讓胎兒停止生長。

事後避孕丸不會傷害胎兒。

- 如果事後避孕丸在懷孕期間被不當使用，它不會對胎兒產生影響。
- 使用事後避孕丸不會影響婦女未來的生育能力。

預防臨時的需要，女性可把事後避孕丸放置家中。

- 許多婦女隨身準備事後避孕丸，以預防臨時可能的需要。
- 為自己事先做準備，妳可以請藥劑師或醫生提供事後避孕丸。

服用事後避孕丸後，需作醫療追蹤。

- 如果妳的月經已遲了三個星期，請檢查妳是否已經懷孕。
- 如果妳需要一般避孕方法或預防性病、愛滋病的服務，請與妳的醫生、診所聯絡。

在加州，任何低收入戶的女性和男性，可能可以透過 Family PACT 獲得免費家庭計劃服務。

如果妳沒有指定的醫生或診所，請撥 1-800-942-1054 洽詢妳鄰近的 Family PACT 提供者。

Approved by the California State Board of Pharmacy
Revised October 2003 • Printed by Pharmacy Access Partnership